

NOTES SUR DES BRYOZOAIRES FOSSILES<sup>1</sup>

PAR E. DARTEVELLE, D<sup>r</sup> SC.

1. Bryozoaires fossiles de Cléry-en-Vexin (Sables de Cresnes).

*Bacebridgia (Porostoma) gyrinus* Canu.

*Bacebridgia (Porostoma) magniporosa* Canu et Caillot.

*Meniscopora Canui* Devis.

2. Bryozoaires fossiles de Campbon (Loire-Inférieure).

*Heterocella subsymmetrica* Canu.

*Rectonychocella dimorpha* Canu.

*Smittipora fragilis* d'Orbigny.

*Setosella cellaroïdes* Canu.

*Gaudryanella variabilis* Canu ?

*Hippoporina cribrovicellosa*, Canu.

*Smittina Derwiesi*, Canu.

*Peristomella coccinea* Abild.

*Adeonellopsis (Cribricella) subteres* Roëmer<sup>1</sup>.

*Meniscopora milleporacea* Milne-Edwards.

*Schizostomella Parnense* Canu.

*Schizostomella crassa* Canu.

*Tubucella mamillata* M.-Edw.

*Lichenopora grignonensis* M.-Edw.

*Lichenopora erecta* d'Orbigny.

Cette faunule est caractéristique du Lutétien moyen.

Ces deux listes ont été rédigées d'après une petite collection appartenant au Muséum d'Histoire Naturelle, communiquée par M. MORELLET.

3. *Thalamoporella* sp. ?

Parmi les calcaires en plaquettes du Lutétien supérieur (partie

1. *Labopora coscinophora* (REUS). F. CANU, Bryoz. des terrains tert. des env. de Paris, *Ann. de Paléontologie*, II, 1907, p. 44.

Cf. E. DARTEVELLE, Bryozoaires du Lut. de Gomerfontaine, *Ann. Soc. R. Zool. de Belgique*, LXV, 1934, p. 116.

2. CANU et BASSLER, North Am. Early Tert. Bryozoa. *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1920, p. 269, Pl. 85, fig. 14 (*Th. prima*, Canu et Bassler),

inférieure, saumâtre), de Paissy (Aisne), j'ai trouvé au cours de l'excursion dirigée par M. le Prof. LERICHE aux environs de Reims et de Laon en 1935, un Bryzoaire, malheureusement fort mal conservé, mais dont l'attribution générique probable me paraît digne d'être signalée.

Il semble en effet devoir se référer au genre *Thalamoporella* Hincks, dont des représentants furent signalés dans l'Aquitaniens de Touraine<sup>2</sup>, et dans l'Oligocène des États-Unis<sup>1</sup>.

Les zoécies sont bordées d'un cadre saillant, paraissent rectangulaires, allongées, très distinctes, séparées par un sillon peu profond.

L'Opésie est orbiculaire; quant au cryptocyste il est presque entièrement détruit, il semble cependant avoir été perforé de nombreux trémopores, et les opésiules se devinent.

L'onychocellaire est étroit et perforé seulement d'un orifice elliptique. Si cette identification se confirmait, on aurait à abaisser notablement la limite inférieure du genre *Thalamoporella*.

1. CANU et LECOINTRE. Bryozoaires des Faluns, *Mém. Soc. Géol. Fr. Pal.* (4), 1925, p. 40, Pl. V, fig. 9-11 (*Th. andegavensis* Michelin).